

Vacinas existentes:

Vacina BioNTech, Pfizer

Vacina CoronaVac

Vacina Covaxin

Vacina Johnson & Johnson

Vacina Oxford, AstraZeneca

Estes medicamentos são usados como vacinas contra a COVID-19

Vacina Sputnik V

Se você apresentar um caso leve ou moderado, deverá:

- Permanecer em casa e não sair, nem se aproximar de outras pessoas (isolamento)
- Usar uma máscara para não propagar o vírus
- Tomar paracetamol ou ibuprofeno para alívio da febre e das dores

Se o caso for grave, com problemas respiratórios, será necessário procurar o hospital. Os médicos irão:

- Administrar oxigênio
- Às vezes, dar a você remdesivir (um medicamento antiviral) e/ou dexametasona (um medicamento anti-inflamatório)
- Às vezes, colocá-lo em um ventilador (máquina para ajudá-lo a respirar)

Pode ser necessário permanecer ligado a um ventilador por até algumas semanas.

Não há medicamentos que, comprovadamente, matem o vírus, mas os médicos estão testando alguns que poderiam ajudar.

Se você tiver problemas nos rins, pode precisar de diálise.

O exame mais comum utiliza:

Um esfregaço coletado com cotonete do nariz ou da garganta

A amostra é enviada para um laboratório para identificar o vírus ou outras evidências de infecção.

Um exame de sangue pode detectar [anticorpos](#) produzidos pelo sistema imunológico para se defender contra o vírus. O corpo demora algumas semanas para fabricar esses anticorpos; portanto, esse exame não é útil logo que alguém fica doente. Mas ele pode ajudar a dizer se você já chegou a ser infectado.

Se você tiver falta de ar, os médicos geralmente:

Pedirão uma radiografia do tórax para verificar se está com pneumonia

Medirão o nível de oxigênio no sangue com um sensor na ponta do dedo

Mito. Não há evidências de que animais domésticos podem ser via de transmissão do Coronavírus, mas se recomenda sempre lavar as mãos após brincar com os pets.

Verdade. Em caso de febre, tosse e dificuldade para respirar, é preciso ficar alerta. Em alguns casos, também há complicações respiratórias, podendo evoluir para pneumonias.

Verdade. O uso da máscara é recomendado para todos que precisarem sair de casa. No entanto, pessoas assintomáticas devem utilizar máscara caseira de pano. O objetivo é deixar as máscaras descartáveis para pacientes com casos confirmados e com suspeita da doença, além de profissionais de saúde e cuidadores. A recomendação para prevenção é descartar as máscaras a cada 4 horas quando em ambientes externos. Dentro de casa, o uso da mesma máscara pode se manter até que ela fique úmida ou suja.